

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Меры по профилактике гриппа птиц

ГРИПП ПТИЦ – острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус типа А.

К гриппу восприимчивы все виды птиц, в т. ч. куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и синантропные виды птиц (голуби, воробьи, утки, галки и др.), экзотические и декоративные птицы. а также свиньи. лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки и человек.

Источники вируса гриппа птиц в природе

Основным источником вируса в природе является водоплавающая птица, которая переносит вирус в кишечнике и выделяет его в окружающую среду со слюной и пометом. При этом никаких видимых признаков заболевания у самих птиц вирус не вызывает.

Пути заражения

Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной живой и мертвой дикой или домашней птицей.

Возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

Кроме того, выделения зараженных птиц, попадая на землю, в воду, на растения, могут стать причиной заражения человека и здоровой птицы при питье, купании и через грязные руки. Также заражение может произойти воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями.

Симптомы у домашних птиц и человека

У заболевших диких или домашних птиц отмечается необычное поведение, нарушение координации движений, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается опухание и почернение гребня и синюшность сережек, отечность подкожной клетчатки головы, шеи и гибель птицы в течение 24-72 часов.

У человека от заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание начинается остро с озноба, повышение температуры до 38⁰С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Через 2-3 дня появляется затрудненное дыхание, влажный кашель, часто с примесью крови. Опасен такой вирус тем, что он может быстро привести к пневмонии, может давать тяжелые осложнения на сердце и почки, поражает головной мозг.

В целях профилактики гриппа птиц у людей необходимо:

1. Соблюдать правила личной гигиены, в том числе не хранить совместно с продуктами, которые не будут подвергаться тепловой обработке (хлеб, сыр, колбаса, кондитерские изделия и т.д.), сырое мясо птицы и яйца.
2. Избегать контакта с подозрительной в заболевании или мертвой птицей.
3. Ухаживать за домашней птицей в выделенной для этих целей рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь). В период контакта с птицей (кормление, уборка помещений и пр.) не следует принимать пищу, курить.
4. Приобретать мясо птицы и яйцо в местах санкционированной торговли только при наличии у продавцов ветеринарных сопроводительных документов на данную продукцию.
5. Употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо варить не менее 10 минут, мясо – не менее 30 минут при температуре 100⁰С.
6. Исключить контакт с водоплавающей и синантропной птицей (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и др.).

Как защитить свою птицу?

1. Обязательно регистрировать в администрации муниципального образования и учреждении государственной ветеринарной службы всю домашнюю птицу, голубей и другую птицу, содержащуюся на подворьях, в голубятнях и открытых вольерах.
2. Содержать территории и строения для содержания животных и птицы в полной чистоте, проводить тщательную очистку и дезинфекцию всех помещений и территории. Для дезинфекции можно использовать 3% горячий раствор каустической соды, хлорсодержащие препараты, например, 3% р-р хлорной извести (хлорамин), гипохлор, део-хлор. и др. После дезинфекции насесты и гнезда необходимо побелить 2 раза с интервалом 1 час свежегашеной известью.
3. Если вы бываете в местах, где можете испачкать обувь пометом дикой птицы, особенно уток, то обувь перед входом на подворье надо вымыть, а еще лучше продезинфицировать одним из дез. средств (см. выше) либо горячей водой с моющим средством.
4. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных для контакта с дикой птицей. Пищевые отходы перед скармливанием необходимо прокипятить.
5. Не использовать для кормления ряску и планктон из водоемов.
6. Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределы дворовой территории, исключить контакт домашней птицы с дикой и синантропной птицей (установить сетки на окна в помещении для содержания птицы).
7. Не потрошить на дворе добытую на охоте птицу.
8. Не приносить во двор убитую или живую домашнюю птицу, приобретенную частными лицами.
9. В период угрозы не рекомендуется покупать живую птицу и пополнять поголовье птицы.

В случае обнаружения павшей или больной дикой птицы, а также во всех случаях заболевания или гибели домашней птицы, просим сообщать по следующим номерам телефонов:

8 (3424) 25-43-81, 22-28-46 - Березниковская ветеринарная лечебница,

8 (3424) 42-23-53 - Усольский ветеринарный пункт,

8 (34253) 7-20-04, 7-21-12 - Соликамская станция по борьбе с болезнями животных.

ГОСВЕТСЛУЖБА